

Symptomer og kliniske funn ved ulike diagnoser		
Symptomer og kliniske funn:	Finnes ofte ved:	Finnes iblant ved:
Utvidelse (aneurisme) eller ruptur (disseksjon) av oppadstigende del av hovedpulsåren (aorta)	Marfans, LDS, FTAAD	Bicuspid aortaklaff, vEDS, cutis laxa
Sprekk (disseksjon) i andre større blodårer (arterier)	vEDS, LDS,	Marfans
"Krøllete" arterier (arterial tortuosity)	LDS, arterial tortuosity syndrome	
Sprekk (ruptur) av organ (livmor, tykktarm, lever, milt, øyne)	vEDS	LDS, kyphoskoliotisk EDS
Punktert lunge (spontan-pneumothorax) eller lungeblødning (hemothorax)	vEDS, LDS, Marfans	I normalbefolkningen
Utvidelse av ryggmargskanalen (dural ectasi)	Marfans, LDS, nevrofibromatose type 1	EDS (flere undertyper), Morbus Bechterew
Løse linser i øyet (linseluksasjon)	Marfans, homocysteinuri, familiær linseluksasjon	
Medfødt klumpfot, hofter ute av ledd		vEDS, LDS
Unormal blødningstendens ved operasjon		vEDS
Brystkassedeformitet (traktbryst, fuglebryst, asymmetri)	Marfans, LDS,	I normalbefolkningen
Lang smal kroppsbygning (marfanoid utseende)	Marfans, LDS,	I normalbefolkningen
Overbevegelighet (hypermobilitet) i ledd, med eller uten smerter	Marfans, LDS, EDS (flere undertyper), cutis laxa, hypermobilitetstilstander	I normalbefolkningen
Tannstillingsproblematikk	Marfans, EDS (flere undertyper), LDS	I normalbefolkningen
Uvanlig blødningstendens/blåmerker	vEDS, LDS	Marfans, EDS (flere undertyper)
Påfallende hudforandringer (brede, atrofiske arr, utpreget overstrekkebarhet, strekkmerker fra pubertet på uvanlige steder, gjennomskinnelig hud med tydelige åretegninger på bryst/rygg)	Klassisk EDS, vEDS, Cutis laxa	Marfans